

みどりの風

第5号

発行日 2008年 4月15日



医療法人社団 倫生会

みどり病院

編集発行：みどり病院 広報誌作成委員会
所在地：〒651-2133 神戸市西区枝吉1-16
TEL (078) 928-1700・FAX (078) 928-1772

C型肝炎の感染原因
C型肝炎ウイルス感染者は、国内に200万人以上と推定されていますが、その内60%の人は自分が感染

していることに気付いていないと言われていました。感染原因は、血液製剤によるものだけでなく、現在の整う以前の時代の輸血や予防注射なども考えられています。

C型肝炎は早期発見・早期治療が重要ですので、過去に血液検査を受けたことのない方は、この機会に検査を受けることをお勧めします。

C型肝炎を放っておくと
C型肝炎ウイルスに感染すると、約7割の方が慢性肝炎となります。その内4割が肝硬変に進み、さらにその内8割は肝臓病になります。

肝臓・肝硬変など肝臓病での死亡者は日本で年間5万人に達しますが、肝臓の原因の8割はC型肝炎ウイルスによるものと言われています。

C型肝炎の治療の進歩
92年にC型肝炎治療にインターフェロンが使えるようになった当初は、ウイルスを完全に除去し、C



副院長 佐伯 啓三

慢性C型肝炎の治療の進歩

C型肝炎の治療の進歩
92年にC型肝炎治療にインターフェロンが使えるようになった当初は、ウイルスを完全に除去し、C

型肝炎は早期発見・早期治療が重要ですので、過去に血液検査を受けたことのない方は、この機会に検査を受けることをお勧めします。

C型肝炎を放っておくと
C型肝炎ウイルスに感染すると、約7割の方が慢性肝炎となります。その内4割が肝硬変に進み、さらにその内8割は肝臓病になります。

肝臓・肝硬変など肝臓病での死亡者は日本で年間5万人に達しますが、肝臓の原因の8割はC型肝炎ウイルスによるものと言われています。

C型肝炎の治療の進歩
92年にC型肝炎治療にインターフェロンが使えるようになった当初は、ウイルスを完全に除去し、C

型肝炎が完治するのは全体の10%にも満たない水準でした。

しかし04年に承認されたペグインターフェロンとリバビリンの併用療法では、48週投与により、ウイルス量が多く難治性のI型のC型肝炎においても50〜60%の完治率に達しています。

C型肝炎は、放っておくと確実に進行しますので、過去にインターフェロン治療を試されて効果の無かった方もこの機会に、専門医にご相談されることをお勧めします。

肝臓発症後の治療方法
また、肝臓にまで進行してしまった場合の治療方法においても、今では、肝臓の切除以外の治療方法が進歩しています。

当院では、肝臓を発症した例に対する治療は、ラジオ波を用いて肝臓を熱凝固させるラジオ波焼灼療法(RFA)を基本に、必要に応じて、肝動脈化学塞栓療法(TACE)や、院外専門医との連携による肝切除なども行っています。

みどり病院の理念

● 私たちは、地域の人々が健やかに安心して暮らせる医療環境づくりに貢献します。

みどり病院の基本方針


- 一般急性期医療を軸に、予防医学から在宅医療までをカバーし、地域の医療ニーズに応えます。
- 患者様の権利を尊重し、十分な説明を行い、安全で良質な医療を提供します。
- 近隣の医療・介護・保健機関と協力し、地域の人々の健康と安心を支える病院をめざします。
- 専門知識の習得や技術の向上に努め、医療レベルの向上に努めます。

診療担当表

		月	火	水	木	金	土
午前 9:00~12:00 (受付 8:30~12:00)	I 診	イナ 稲 ナミ 波	マエ 前 カワ 川	サ 佐 エキ 伯	イナ 稲 ナミ 波	ヒロ 廣 タ 田	交代制 稲波 伊ナミ 佐伯 サエキ
	II 診	サ 佐 エキ 伯	シ 清 ミズ 水	ヒロ 廣 タ 田	シ 清 ミズ 水	ムロ 室 ウ 生	交代制
	III 診	ヌカ 額 タ 田	*	オオ 大 オカ 岡	*	イ 伊 サ 佐	交代制
	外科 整形外科	ヤ 矢 ベ 部	整形外科 ゴ 呉	外科 キ 木 ド 戸	整形外科 ゴ 呉	外科 ヤ 矢 ベ 部	整形外科 ゴ 呉
夜間 17:00~19:30 (受付 16:30~19:30)	I 診	マエ 前 カワ 川	イナ 稲 ナミ 波	サ 佐 エキ 伯	ヒロ 廣 タ 田	シ 清 ミズ 水	
	II 診	サフ 澤 タ 田	*	オオ 大 ニシ 西	エ 江 ハラ 原	*	
17:00~19:00 (受付 16:30~19:00)	外科 整形外科	整形外科 ゴ 呉	(休診)	(休診)	外科 ヤ 矢 ベ 部	整形外科 ゴ 呉	

☆急患は随時受付いたします。(神戸市第2次救急指定病院)

- 診療科目…内科/外科/整形外科/循環器科/消化器科/呼吸器科/リウマチ科/リハビリテーション科/人工透析
- 病床数…108床(一般108床うち亜急性8床)
- 面会時間…平日・土 ▶ 15:00~20:00 日・祝日 ▶ 11:00~20:00



公共交通機関をご利用の場合

- JR明石駅・山陽電車明石駅より
 - 神姫バス乗り場
 - (南2) 三木・社、押部谷方面ゆき (約15分)
 - (南3) 西神中央駅方面ゆき (約15分)
 - 変電所前下車
 - 枝吉交差点を西へ (徒歩約5分)
- JR西明石駅より
 - タクシー利用 (約10分)

マイカーをご利用の場合

- 国道175号線枝吉交差点を西へ約150m

地域連携室 (担当師長：内田)

- TEL 078-928-1700
- FAX 078-928-1772
- メールアドレス uchida@midori-hp.or.jp

地域に根差した医療を行うため近隣の医療機関(診療所および基幹病院等)、介護・保健施設との緊密な連携を図っていきます。
またご入院されてから安心して入院生活が送られるようにいろいろな相談も承ります。



医療法人社団 倫生会

みどり病院

所在地：〒651-2133 神戸市西区枝吉1-16
TEL (078) 928-1700 (代) FAX (078) 928-1772

満足度調査結果のご報告

サービス向上委員会

昨年12月、外来患者様向けの満足度調査を実施しましたので、集計結果をご報告します。アンケート配布枚数500枚、回収37枚、回収率75%。

職員の接遇態度、待ち時間、

院内環境などの各項目について、大変満足・満足・普通・やや不満・不満の5段階で回答して頂きました。


大変満足を5点、満足4点、普通3点、やや不満2点、不満1点として平均点を計算した結果、職員の接遇は概ね4点弱となったものの、待ち時間に対する評価が3点を割り込み、不満が満足を上回

る結果となりました。

同時期に実施した待ち時間調査では、診察待ち時間の平均が28分、会計待ち時間が14分となっており、過去3年間にわたり改善傾向にはありますが、今回の満足度調査を受け、より一層の改善に努めることとします。

調査へのご協力ありがとうございました。

●外来患者様 満足度調査アンケート結果●



第3回 看護・介護職向け勉強会を開催しました

1月30日(水)午後2時から当院会議室にて、介護施設の職員の方を対象に、経管栄養についての勉強会を開きました。

近隣の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設7施設から、17名が参加されました。

ほぼ1年ぶりの勉強会でしたので、以前の復習も兼ねて、消化器内科の前川医師から、実践的なPEG(胃ろう)管理の仕方について、学びました。

最近、当院でも、施設からの紹介入院患者さんに対して、摂食嚥下障害のためPEGを造設する例が増えています。当院では、施設でも在宅でも、要所をきちんと押さえれば決して難しくないと



PEGの扱い方を教育し、普及を図りたいと考えています。

当日の講義の内容は、

- ・PEG管理の実際、
- ・半固形化投与方法の有効性、
- ・寝たきり患者の身体測定(身長、体重)の実際、
- ・PEG患者が陥りやすい、栄養上の問題点として、栄養過剰、水分不足、低ナトリウム血症、微量元素不足を挙げ、それへの対処法、などでした。

また、現実問題として、介護保険では不十分な食費の話(お金の話)も避けて通れませんでした。そこで、

- ・できるだけ市販の栄養剤を用いること、
- ・きちんとした栄養評価を行い、それに基づいて投与計画を行うこと、
- ・コスト意識を持ちつつ、患者さんの状況に応じた経管栄養の実際について、医療・介護側双方がよく協議して決めていくことを、提案させて頂きました。

●ご相談は、
栄養科 田垣(管理栄養士)、
消化器内科 前川 まで。

今後、このような施設介護の現場で役立つ知識の提供を念頭に、年2回程度の定期的開催を心がけてまいります。

リウマチ医療連携フォーラムが開催されました

1月30日(水)19時から、西神オリエンタルホテルにて、標記フォーラムが開かれ、みどり病院の稲波院長が「生物学的製剤は本当に関節リウマチの寛解をもたらすか?」と題して講演しました。この集まりには、主に地域の開業医、勤務医の先生方など、合わせて26名が参加されました。

講演では、生物学的製剤である「エンブレル」の関節リウマチに対する有用性について、話しました。

その要点は、関節リウマチ(RA)は、持続性で進行性の関節炎を主症状とする自己免疫疾患。女性にやや多く、遺伝的背景を持つものが6割を



超え、治療しなければ就労不能状態に陥る慢性疾患です。しかし、エンブレルは骨破壊抑制に優れているので、寛解は現実的なゴールになります。早期RAほどエンブレルに対する感受性が高く、エンブレル導入が早いほど速やかに寛解に達するという研究があります。

当院での投与方法は、エンブレル25mgを週2回投与し、免疫抑制剤の経口剤などを加えていく方法です。また、免疫抑制剤が副作用で使用できない場合には、エンブレルのみで使用する場合もあります。

まとめると、
・エンブレルは安全で効果も高い。
・早期RAに用いるほうが効果は高い。

・多くのRAは長期コントロールが可能である。
・ただし、エンブレルは高価。治療効果を見て減量も可能ということになります。
さらに詳しくは、当院のホームページをご覧ください。

みどり保育園

1984年12月に「みどり診療所(当時)」が開所もなく、院内保育所として開設しました。

当時は病院の西隣のマンションの1室での運営でしたが、当時としては画期的な施設だったと思います。

地域の院内保育所が減少していく中、わが園は今でも在籍32名、毎日12名~15名のお子さんが元気に登園して来られます。

お子さんが増加していく現状から、開設から約20年後の2006年4月に現在の場所へと移転し、保育園職員や保護者の希



望が叶った園庭のある、明るく、のびのびとした、セキュリティ完備の保育園が完成しました。
産休明け(3ヶ月児)から4歳児までのお子さんを、24時間体制で保育させてもらっています。
「お誕生会」や「親子親睦会」「親子遠足」など楽しい行事も充実させながら、毎日子ども達と一緒に過ごしています。

●みどり保育園●

みどり病院より
徒歩5分

E-mail
midori_hoikuen@nifty.com

ホームページもご覧下さい!!

みどり病院のいろんな情報を、
ホームページでも公開しています。
下記アドレスまでアクセスしてください!

<http://www.midori-hp.or.jp>



みどり病院に入院中の方へのお見舞いメッセージを、Eメールで送ることができます。詳しくは、みどり病院ホームページにアクセスして下さい。